

# MIDWEST EAR, NOSE & THROAT SPECIALISTS, P.C.

V. Richard Bowen, M.D. Mark L. Keller, M.D.

Hastings Medical Park 2115 North Kansas Suite 203 - Hastings, Nebraska 68901  
(402) 463-2431 Toll Free: 1-800-348-0368

**Paciente:** \_\_\_\_\_

**Fecha de la Cirugia:** \_\_\_\_\_

Tiempo: Hastings Surgical Center se pondrá en contacto con usted **el día antes de la cirugía.**

## REPORTE A:

**HASTINGS SURGICAL CENTER**  
5803 OSBORNE DRIVE WEST  
HASTINGS, NEBRASKA 68901  
1-402-462-5440

**NO ASPIEINA, MOTRIN O PRODUCTOS DE IBUPROFEN DOS SEMANAS ANTES DE LA CIRUGIA** *Esto también incluye medicamentos para la artritis Celebrex como Mobic (Meloxicam) y algunos suplementos de hierbas como la hierba de San Juan, vitamina E y aceite de pescado.* En tiempos, sangrando en el periodo postoperatoria esta asociado con la ingesion de aspirina. Es absolutamente necesario que el paciente se abstenga de la aspirina o productos que contengan aspirina, Motrin, Ibuprofen o medicamentos para diluir la sangre por dos semanas antes y despues de la cirugía. **Tylenol puede ser tomado.**

**NADA DE COMER O BERBER DESPUES DE MEDIA NOCHE EN EL DIA DE LA CIRUGIA** Cuando al paciente se le ha dado un anestésico, hay perdida de reflejos en la garganta y si el paciente vomita, esta se lleva hacia los pulmones y crea una infeccion muy seria y una reaccion; por lo tanto es absolutamente neccessario que el paciente no coma o beba nada despues de la medianoche antes de la cirugía.

## **NOTICIAS IMPORTANTES**

Sis u compania de serguero solicita pre-certificacion para una tomografia CT, MRI;s o cirugias, por favor pongase en contacto con su proveedor de seguro es la responsabilidad de usted de hacer cualquier pre-certificacion. **Sis u compania de serguero solicita cualquier informacion adicional, por favor digale que llame a nuestra oficina y nosotros los asistiremos con gusto para el beneficio de used.**

## **PASIENTES CON TUBOS EN LOS OIDOS**

**El paciente debe ser revisado por el Dr. Bowen o el Dr. Keller cada cuatro meses, aun si el o ella no estan tiendo problemas.**

## **TAPONES DE OIDO**

Pacientes con tubos en los oidos deben tener puesto tapones en los oidos para mantener el agua fuera de los oidos mientras se bana. Nosotros recomendamos tener puestos los tapones cuando la persona nade tambien.

**SI USTED SE PAGA POR SU CUENTA O SI TIENE ASISTENCIA MEDICA, USTED DEVERA CONTACTAR HASTINGS ANESTHESIOLOGY (Mary Lanning Hospital) PARA ESTABLESER UN PLAN DEPAGO.**